

AÑO IV

LA MORTALIDAD

DE LA

C I U D A D D E M O N T E V I D E O

(REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)

Durante el año de 1896

POR

El Dr. JOAQUIN DE SALTERAIN

Del Retrospecto de "El Siglo"

MONTEVIDEO

IMPRENTA A VAPOR DE "EL SIGLO", 25 DE MAYO NÚM. 58

1897

A su distinguido amigo el br. br. Luis Melian Lafinur.

LA MORTALIDAD

DE LA

C I U D A D D E M O N T E V I D E O

(REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)

Durante el año de 1896

POR

El Dr. JOAQUIN DE SALTERAIN

AÑO IV



Del Retrospecto de "El Siglo"

81.235

B. 569

MONTEVIDEO

IMPRENTA Á VAPOR DE «EL SIGLO», 25 DE MAYO NÚM. 58

1897

La Mortalidad de la ciudad de Montevideo

Por el Dr. SALTERAIN

DESDE DICIEMBRE DE 1895 HASTA NOVIEMBRE DE
1896, INCLUSIVE

(IV AÑO)

El año demográfico de 1896, que termina en los momentos que escribimos estas líneas, no ha desmentido, afortunadamente, las conclusiones á que habíamos llegado en los anteriores que nos ha sido posible considerar. Antes por el contrario, las abona y las ratifica, dando así razon á los dictados que la profilaxia higiénica, cimentada hoy sobre bases positivas y no sobre doctrinas mas ó menos seductoras, establece y enseña.

Es innegable, no obstante, que la aplicación sistemática y metódica de todos los principios y experiencias que la higiene moderna preceptua, no encuentran entre nosotros campo fecundo en donde poder desenvolverse. Ciencia absolutamente nueva, de actualidad pudiera decirse, va adquiriendo su desarrollo día á día, sin que, aún los países de civilización clásica y avanzada puedan jactarse de cumplir sus exigencias con el rigorismo necesario. No es de extrañar, pues que nosotros, en nuestra calidad de pueblos nuevos y sin individualidad acentuada todavía, al menos en el orden intelectual, adolezcamos de deficiencias, ya que no de preocupa-

ciones sectarias de las que aquellos mismos adolecen.

En cambio, las facilidades de la vida, los beneficios de un clima templado y suave, así como las ventajas de nuestra situación topográfica excepcional, antes de ahora lo hemos dicho, colocan á la ciudad de Montevideo, edificada sobre un sub-suela de rocas, con anchas y espaciosas calles y saneada perpetuamente con las emanaciones de la brisa marina, en condiciones que necesariamente tienen que influenciar, como en efecto sucede, en la salud y en la higiene de todos sus moradores

Y aun cuando nuestras instituciones carezcan de la autoridad y medios adecuados y las obras de saneamiento no hayan alcanzado todo el perfeccionamiento posible, no por eso deben considerarse como factor baladí. Al fin y al cabo, Montevideo, ciudad de más de 200.000 habitantes, amen de las ventajas naturales de su situación y de su clima, posee por ej: su sistema de caños maestros de desagüe y alejamiento de sustancias excrementicias, antes que la pluralidad de las ciudades de América y aún antes también que muchos de Europa, aguas corrientes, conducidas desde un trayecto de más de diez leguas de la ciudad; caños de vaciamiento en excelente estado y contruidos con materiales superiores y aguas corrientes que, si por ser de río, no son las mas puras, están en mejores condiciones que muchas de las ciudades populosas del extranjero y jamás, se ha demostrado bacteriologicamente, han servido de vehiculo para la difusión de ninguna epi-

demia. Tiene así mismo un personal docente que si no marca rumbos en las cuestiones científicas, porque para nosotros no ha llegado todavía el período en que el culto de la verdadera ciencia sea materia de dogma indiscutible, contribuye con su enseñanza al progreso de las ideas. — Cuenta también, entre sus instituciones, la de Consejo Nacional de Higiene, bien organizado, y que asume la superintendencia general en lo que se refiere á la salud y la higiene terrestre y marítima; Hospitales, Asilos y Laboratorios oficiales y particulares; Casa de desinfección, Instituto de Vacuna, perfectamente atendido é Instituto de Higiene Experimental, este último de data reciente y de positivo provecho para el estudio y la profilaxia de muchas enfermedades. -- De estos dos últimos, el primero ha servido para difundir por el territorio de la República, la vacunación contra la viruela, con resultados que muchos otros países envidiarían; el segundo, aunque de reciente creación, bajo la indiscutible dirección del profesor Sanarelli, amén de otros beneficios, ha vulgarizado, puede así decirse, el empleo del suero anti-difterico, que, perfectamente preparado, empieza ya á dar los resultados que han sido puestos en evidencia en el mundo científico.

Recapitulando pues, y terminando estas consideraciones generales, Montevideo posee un coeficiente de mortalidad sumamente bajo, infimo casi, así en el año que estudiamos, como en los anteriores, que parece no alterarse y que, según nuestras humildes opiniones, es corolario forzoso, deducido de las

premisas que á grandes rasgos dejamos enunciadas.

Véase en apoyo de semejantes afirmaciones la marcha que ha seguido la mortalidad, en estos últimos años en el Departamento y en la ciudad de Montevideo:

Departamento de Montevideo. (Anuario Estadístico:)

1890 defunciones.		5.695
1891 »		5.207
1892 »		4.256
1893 »		4.051
1894 »		4.024
1895 » Registro Civil.		3.891

Compárese ahora, la marcha de la mortalidad de la ciudad de Montevideo, según nosotros, teniendo muy en cuenta que en tanto que las oscilaciones de aquella han sido insignificantes, el aumento de población, merced principalmente al crecimiento vegetativo, ha seguido manifestándose.

Ciudad de Montevideo:

1893 defunciones.		2.756
1894 »		3.078
1895 »		2.943
1896 »		3.057

Debe, así mismo, tenerse en cuenta que durante el periodo de tiempo transcurrido, después que empezamos nuestro estudio, no ha diezariado á Montevideo ninguna de las epidemias que de vez en cuando hacen irrupción en las poblaciones. Por lo menos, con los caracteres de epidemia mortífera ó pandémica, pues que el sarampion y la escarlantina han reinado epidémicamente, en algunas estaciones, aún en el año corriente.

*
* *

La nosología, según costumbre, no ha sido llevada con todo el rigorismo exigido, no solamente por los conocimientos científicos modernos, sino también por la nomenclatura legal aceptada por el Consejo de Higiene, que si no es perfecta, lo que no es posible, se ajusta lo bastante á las exigencias principales de la estadística.—I lo mas doloroso, es que sea en la parte relativa á la clasificación de las heridas, facilísima por cierto, y del resorte casi exclusivo de los señores médicos forenses, la que mas abunde en vacíos y omisiones imperdonables como p. ej. *herida de arma de fuego*. (de que órgano?) *herida penetrante* (de donde?) y otros que seria prolijo enumerar.

A este respecto, así mismo, tenemos que señalar á las autoridades correspondiente, la necesidad que existe en crear un servicio de autopsias y de revisión de certificados, así para comprobar las causas de fallecimiento en los casos de accidente ó muerte sin asistencia médica, y que bonitamente califica á simple vista el facultativo, de *síncope cardíaco* ó *afección orgánica del corazón*, como para corregir aquellos certificados que no se adaptaran á la nomenclatura prescrita por la ley de la materia.

*
* *

Elevándose la mortalidad total del año que consideramos (escepcion de los nacidos sin vida, según es de uso) á la cifra de 3057 fallecidos y calculando la población de Montevideo en 246.000 habitantes (el Anuario Es-

tadístico de 1894 le asigna al departamento de la capital la cifra de 255.255) tenemos que la proporción de muertos en el año corriente ha sido de 14, 15 por mil.

La marcha proporcional de la mortalidad en los cuatro años que llevamos estudiados, ha sido:

1893 mortalidad por mil	15.84
1894 « « «	14.31
1895 « « «	13.68
1896 « « «	14.15

Proporcion médica de la mortalidad, por mil, en los cuatro años estudiados — 14.15.

Sigue pues Montevideo, figurando á la cabeza de las principales ciudades del nuevo y del viejo mundo, segun podrá comprobarse leyendo la tabla siguiente, que para la casi totalidad de ellas publicaron los periódicos de Europa, durante el año 1894 y que en la parte relativa á América, la referimos á los datos suministrados por el «Anuario demográfico del Uruguay» correspondiente al año 1895.

MONTEVIDEO	14.15	Burdeos	21.2
Louisville	14.80	Nueva York	21.6
Chicago	15.4	Magdeburgo	21.8
Bristol	15.4	Bolonia	21.9
Francfort	16.6	Buenos Aires	22.0
La Haya	16.9	Praga	22.1
Berlin	17.2	Odessa	22.3
Lieja	17.6	Saint-Etienne	22.7
ondre	17.7	Viena	22.8
Leeds	17.8	Colonia	23.4
Bruselas	18.1	Lille	23.5
Hamburgo	18.1	Munich	33.7
Amsterdam	18.3	Liverpool	23.8

Bale	48.5	Nantes.	23.9
Birmingham	48.5	Budapest	24.4
Leipzig	48.8	Gratz.	24.5
Copenhaguen	48.7	Dublin	24.7
Turin	48.8	Varsovia	25.0
Zurich	48.9	Milan	25.0
Ginebra	49.0	Breslau	25.5
Amberes	49.4	Reims	25.8
Providence	49.5	Nápoles	27.7
Roma	49.6	Marsella	28.3
Christiania	49.6	Jassy	28.3
Niza	49.7	Nueva Orleans	29.2
Gand	49.7	Barcelona	29.6
Glasgow	20.0	Rio Janeiro	29.8
Paris	20.2	El Havre	29.8
Rotterdam	20.2	Bucharest	29.9
Manchester	20.4	Trieste	30.1
Filadelfia	20.4	Ruan	31.3
Brooklyn	20.9	San Petesburgo	21.4
Lyon	20.9	San Pablo	33.2
Dresden	20.5	Moscú	34.1
Berna	21.0	Córdoba (R. A.)	37.7

Los meses en que mayor ha sido el número de muertos, fueron: Noviembre, 289 y Diciembre, 285; y aquellos en los cuales la mortalidad ha sido inferior: Abril, 215; Setiembre, 221 y 228.

Proporcion de muertos, por mes, en el año estudiado, 254.75.

En el año anterior, la proporción fué de 245.25.

Proporcion de muertos. por dia, en el año corriente, 83.7.

En el año anterior, la proporcion fué de, 8 06.

Malgrado tan pequeña elevacion, como la que resulta de la comparación de semejantes cantidades al terminar esta parte, volveremos á repetir lo que en años anteriores aduciamos relativamente á Montevideo, y ello por considerarlo aun de actualidad. «Se muere poco
« porque se vive relativamente bien, habitando
« una ciudad perfectamente orientada, espues-
« ta á todos los vientos que las oxigenan per-
« durablemente con el aire marino, edificada
« sobre un suelo de rocas, de calles anchas y
« espaciosas, es decir, con robustos pulmo-
« nes para la ventilación y donde, afortuna-
« damente, el último de los moradores tienen
« luz á sus anchas y aire abundante con que
« regenerar su sangre.»

« Cabeza y metrópoli de un pueblo joven,
« á donde afluyen individuos de las zonas mas
« apartadas del universo, con el incentivo
« del trabajo y de la riqueza, ciudad nueva y
« enteramente cosmopolita, Montevideo es
« una población sana por mas de un concepto
« y, por lo tanto, posee las condiciones esen-
« ciales para ensancharse en todo sentido y
« poder, en lo porvenir, llegar á ser un orga-
« nismo fuerte y robusto.»

Enfermedades generales, epidé- micas etc.

a) Elevándose á 3057, la cifra de los fallecidos en el año 95-96 y el número de muertos por afecciones epidémicas, á la de 1339, la proporcion es de 43.80 por ciento sobre la totalidad. En el año anterior la proporción fué de 42.51

El número de fallecidos por viruela, en vez de 10 como el año anterior, se elevó á 13 en el corriente. Sin embargo si se reflexiona que que en aquel, el número de atacados llegó solamente á 54, en tanto que en el actual fué de 138, la proporción es bastante favorable, pues para el primero se eleva á la de 18.51 por ciento de enfermos, en tanto que para el último descendió á la de 9.42 sobre el total de atacados.

De todos modos, semejantes cifras nos enseñan á perseverar en las prácticas profilácticas seguidas con bastante ahinco en estos últimos años, demostrada como lo ha sido hasta la evidencia, la desaparicion de las epidemias terribles que antes de ahora diezaban á la república.

b.) El número de fallecidos de difteria fué de 51 en el año anterior y solamente de 38 en el corriente. Ahora bien, como el número de enfermos en los dos casos, fué idéntico (176) tenemos que la proporción de fallecidos, sobre el número de atacados, que durante 1895 se elevó á 28.97 descendió en el de 1896 á 21.65.

Indudablemente, nos encontramos en condiciones muy inferiores, con esas cifras, á las demostradas por Hecker para Alemania, donde, para no citar sino un ejemplo, en Berlin la mortalidad por difteria que en 1883, fue de 24 32 por 10.000 habitantes, descendió en 1893 á 9.83. Lo mismo diremos de las referidas por el Prof. Richet para Paris en que de 51 por 100, la mortalidad, durante 1893, descendió hasta la cifra de 6 por 100 en 1895, después de la aplicación del suero anti-diftérico de Behring. Tomando en consideración, no obs-

tante, que, la aplicación del método nuevo, entre nosotros, es de data reciente y ha dado sin embargo positivos resultados, no es temerario presumir que á medida que aquel se generalice, segun empieze á suceder, á lo que no poco contribuirán los sabios trabajos del Instituto de Higiene, cada vez sea menos el número de casos fatales que tengamos que constatar.

c) Señalamos al terminar nuestros estudios del año anterior, la aparicion de una epidemia de sarampiou, cuyos primeros casos se manifestaron principalmente en el Asilo de Expósitos y Húerfanos, así como en el cuartel 3.º de Cazadores, entre la tropa, extendiéndose luego á todos los ámbitos de la ciudad.

En los meses siguientes, la epidemia siguió su período de invasion y difusión elevándose á 254 el número de atacados, durante el de Diciembre, disminuyendo luego, despues de una ligera recrudesencia que tuvo lugar, en el de Mayo, para quedar estacionaria, con tendencias á la desaparicion, en los últimos del año actual.

Esa epidemia, que, puede decirse ha durado el espacio de mas de un año, afortunadamente no ha presentado caracteres de malignidad sensibles, pues que de 971 atacados, segun las denuncias de los señores facultativos, solo se produjeron 41 casos de letalidad, los que arrojan la proporcion de 4.22 por ciento de muertos, sobre el total de enfermos. (Ferdinand Widál dice, que la proporcion de casos fatales, segun los caracteres mas ó menos malignos de la enfermedad, oscila entre 6 y 50 y hasta 70 por ciento).

d.) La Escarlatina, al revés del Sarampion, que en años anteriores se habia presentado bajo la forma epidémica, disminuyó, de 449 casos á que llegaron en el año de 1893, hasta el número de 108, que no dieron sino un total de 6 defunciones en todo el espacio de los doce meses que estudiamos. La proporción de muertos, pues, sobre el número de enfermos, resulta ser de 5.55 por ciento.

e.) La Fiebre Tifoidea, figura con 44 defunciones, en 204 enfermos, en vez de 45 en 461 que figuraron en el año anterior.

Proporción para el año anterior 27.95 por ciento, sobre el número de enfermos

Proporción para el año actual 20.09 por ciento, sobre el número de enfermos.

No obstante lo poco elevada de la proporción de mortalidad por Fiebre tifoidea, sobre la densidad de la población, proporción que no llega sino á la de 1.898 por 10.000 habitantes, (Segun l' «*Annuaire Statistique de la Ville de Paris* para 1896,» la de ese año fué de 2.676 por idéntico número de habitantes), teniendo en cuenta su profilaxia conocida y su fácil aplicación en Montevideo, que posee con agua de regular calidad y red conveniente de cloacas, los elementos esenciales, bien podia, la autoridad, preocuparse algo de la higiene de las habitaciones, en lo concerniente á la construcción de aljibes y letrinas, con el fin de evitar su propagación en todos los casos.

Ya dijimos, en años anteriores, que, á ese respecto el Consejo de Higiene, asesorado por el Departamento de Ingenieros, en 1893 aconsejó la adopción de una medida general,

en materia de construcciones, que fué aprobada por la Superioridad en Setiembre de 1894, sin que hasta la fecha haya servido para otra cosa, que sepamos al menos, sino para aumentar el ya indigesto y monumental protocolo de nuestra legislación escrita.

No queremos abundar en razonamientos conocidos por todos los que se ocupan de estas materias, por considerarlos iloficiosos y fuera de lugar.—Basta solo recordar, que merced al saneamiento de las ciudades y de las habitaciones, ha disminuido la fiebre tifoidea en las proporciones siguientes: en el reino Unido, de 9.8 por 10.000 habitantes á 2.1; en Lóndres de 9.9 á 1.6; en Bruselas de 10.0 á 2.3; en Berlin, de 10.4 á 1.4—Segun el «*Annual Report of the Registrar-General 1894*» la proporcion para el Reino Unido y especialmente para Lóndres, ha sido todavia menor que la enunciada.

Y en lo que se relaciona con la adopcion de Water-Closets aconsejada de preferencia por el Consejo de Higiene de la época, basta solo recordar que, segun Roechling, en Leicester, durante los años 1893-94, en 634 casos de fiebre tifoidea que se produjeron, se observó que de 1.000 habitantes que poseian closets, 22.54 fueron contaminados, elevandose la proporcion hasta 30.89 para las construcciones que carecian de ese sistema de letrinas.

f.) La fiebre puerperal que en el año anterior produjo 9 defunciones, elevó á 13 las del corriente, siendo muy de notar que de estos casos fueron denunciados solamente 8, lo que acusa una violacion evidente de las or-

denanzas expedidas por la autoridad competente.—Suma... y van unas cuantas.

g) Elevandose á 587 el número de fallecidos por afecciones tuberculosas (429 del pulmón), obtenemos una proporción ascendente aterradora, que se encuadra en los cálculos del malogrado Prof. Rochard (3.^a parte de la totalidad de defunciones) y ratifica las previsiones enunciadas entre nosotros por el Prof. Sanarelli, en su magistral lección de inauguración del «Instituto de Higiene Experimental».

A este respecto, no es un misterio para nadie, que cuantos cálculos ha establecido la profilaxia y cuantas previsiones ha recomendado la higiene, han resultado ilusiones más ó menos generosas, pero ilusiones al fin, efímeras y fugaces.

Se reconoce y se estudia la causa que produce tantas devastaciones; se descubre el bacillus, en las profundidades del organismo; se conoce su evolución; se le aísla de los demás de su orden y se describe minuciosamente su morfología y su estructura.—La terapéutica, empero, permanece estacionaria y el rico, como el pobre, el joven adolescente, como el adulto desenvuelto y vigoroso, el habitante de las campañas, como el de las ciudades populosas, el morador de las zonas tórridas, como el de los climas templados: todos, pagan tributo, y tributo oneroso, á ese monstruo insaciable de la familia humana, que se adapta á todos los climas y á todos los rangos de la escala social.

Córdoba, la celeberrima Córdoba de la República Argentina, donde acuden tantos de

nuestros tísicos en demanda de aire reparador para sus pulmones gastados y enmohecidos, con una cifra de 52.209 habitantes, escribe el número de 203 fallecidos por tuberculosis en 1894.—Londres, la ciudad donde mas y mejor se ha atendido á todas las cuestiones de saneamiento colectivo é individual, y Paris la Atenas, moderna donde convergen habitantes de las cinco partes del mundo, acusan cada una, mas de 10.000 individuos fallecidos anualmente por tuberculosis diversas; Montevideo, que puede citarse por su coeficiente de mortalidad total, asaz halagador, figura con 587 en 1896; 49.20 por ciento de fallecidos de tuberculosis sobre la mortalidad total, y 27.17 de muertos por cada 40.00 habitantes.

Seguramente que las conmociones políticas todas, de la familia humana, con el auxilio de las invenciones modernas, de los cañones de tiro á grandes distancias y de la melinita de Mr. Turpin, no devoran la centésima parte de lo que consume el micro-organismo difundido, aunque invisible, por donde la vida animal se desenvuelve y se desarrolla.

Véase ahora la marcha que la tuberculosis ha seguido en Montevideo, en los años de nuestros estudios.

Tuberculosis pul. 1893.	. . .	319	Total
Otras tuberculosis.	. . .	403	422
Tub. pulmonar 1894.	. . .	389	
Otras tuberculosis	. . .	455	535
Tub. pulmonar 1895.	. . .	352	
Otras tuberculosis	. . .	161	513
Tub. pulmonar 1896.	. . .	429	
Otras tuberculosis	. . .	458	587

Total de fallecidos por tuberculosis en los cuatro años de la referencia: 2037.

h.) La cantidad de 156 fallecidos por afecciones neoplásicas ó cancerosas, es casi igual á la de años anteriores (150 en 1894 y 95) siendo la proporcion absoluta, la misma 5.40 por ciento, sobre la mortalidad total.

Relativamente al número absoluto de afecciones neoplásicas, nuestra estadística es bastante favorable, comparada con las de la mayoría de las ciudades. pues que, en tanto, que, entre nosotros, la cantidad de fallecidos, es la misma, en aquellos se observa una tendencia sensible á ir aumentando.

i) Las demás afecciones del grupo de las generales, no ofrecen circunstancia digna de mencionarse, fuera de los 13 casos de alcoholismo (el año anterior 21) y de 37 de sífilis (el año anterior 31) que, raros antes de ahora, tienden á generalizarse, y por su género deben haber contribuido al número de neuróticos, degenerados é irresponsables, tan elevada ya dolorosamente, en medio de nuestro estado social. Como esplicarse, sino teniendo en cuenta la influencia de esos dos poderosos factores, la exhuberante población que llena nuestro vasto manicomio, donde, según entendemos, se albergan de 500 á 600 desgraciados?

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

Las enfermedades del sistema nervioso, se han elevado al número 441, (en el año anterior 337) predominando en ellas, como siempre, las diversas formas de meningitis, que ellas solas llegan á la subida cifra de 187.

Evidentemente, muchas de ellas, la mayoría quizás, es probable sean de origen tuberculosos, pero, como de ese origen ó de otro cualesquiera, son afecciones propias de la infancia y del periodo del crecimiento, no es temerario inducir puedan tener influencia en su grado de frecuencia, las negligencias y descuidos en la alimentación de los niños y la peligrosa confianza con que hoy día, entre nosotros, se generalize, ya por necesidad, entre las clases menesterosas, ó por falta de abnegación, entre las pudientes, el sistema de lactancia artificial que consiste en la cocción interminable de la leche, del alimento vivo por excelencia, llevado á cabo en casa, por manos inesperimentadas y candorosas, ó por algun espendedor al por mayor de la fabrica vecina.

Sea de ello lo que fuera, la cifra elevada de meningitis y afecciones análogas, exige estudio y exámen minuciosos.

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

La cifra de 459 fallecidos por afecciones del aparato respiratorio, casi iguala á la del año anterior, durante el cual fallecieron 443, y entrambos están comprendidos más bien por debajo de la normal, pudiéndose explicar, esta circunstancia por la coincidencia de la benignidad relativa de los dos últimos inviernos, durante los cuales apenas se experimentaron los rigores propios de semejante estación.

No obstante, debemes de señalar 218 casos de bronco-pneumonía, casi la mitad de las demás del grupo, que por ser también propias de los primeros años de la vida, contribuyen en gran parte á elevar el ya elevado coeficien-

te de la mortalidad infantil, la edad peligrosa y la más desprovista de sábios cuidados y de leyes protectoras, entre nosotros.

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

La cantidad de fallecidos, por afecciones del aparato circulatorio, elevada al número de 271, acusa solamente un aumento de 28 muertos comparada con la del año anterior, que no llegó sino á 243. Pero como la totalidad de muertos en el año actual, ha sido algo mayor, tenemos que este grupo forma menos de la undécima parte del total, en vez de la octava y de la séptima que formara anteriormente.

Figuran, empero, y con número muy elevado, por ejemplo: las afecciones valvulares, que sumaron 85 defunciones, — el síncope cardiaco, donde se nota la cifra de 27, diagnosticado problemente *post mortem* y sin ningún género de verificación y la *angina de pecho*, variedad rara antes de ahora, con 15 y sobre cuya producción no ha de haber influido en pequeño grado, seguramente, el uso exagerado del alcohol y del tabaco, (¡qué alcohol y qué tabaco!) á pesar de los derechos restrictivos que con solicitud paterna y liberal les aplica á estas dos sustancias el Superior Gobierno de la República.

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS

Las enfermedades de este grupo, figuran solamente con el número de 314, en vez de 344 á que ascendieron el año anterior.

Son de notar como siempre, entre las principales, las diversas formas de gastro-enteritis, que elevándose, en la forma infantil, al número de 110, contribuyen tambien poderosamente

samente, y quizás por las mismas causas que antes de ahora hemos enunciado, á acrecer la siempre subida cifra de muertos en los primeros años de la vida.

También deben mencionarse, en este grupo, 37 casos de cirrosis hepática, en cuya etiología, como se sabe influye poderosamente el abuso de los alcoholes.

OTRAS ENFERMEDADES

Los demás grupos de enfermedades, ni por su número, ni por su significación, ofrecen particularidad alguna digna de mencionarse, hecha excepción de 39 casos de urémia que figuran en las del aparato génito urinario, y hecha la salvedad que antes de ahora hemos puesto de manifiesto, en lo que se refiere á la clasificación en extremo defectuosa de las heridas y muertes violentas.

EDADES

Como regularmente acontece, los primeros años de la vida. suministran el mayor contingente á nuestras tablas de mortalidad, — este decrece de los diez á los 14 años, se eleva mas tarde entre los 30 y 35, permanece estacionario en el resto.

Entre un total de 3.057 muertos, obtenemos en el año corriente, la suma de 4256 fallecidos, desde un día hasta 9 años, vale decir, casi la tercera parte del número total de defunciones. Cantidad menor, es cierto que la del año pasado, en cuyo espacio, entre 2943, fallecieron 4173; pero cantidad elevada siempre y cuadro el mas sombrío de la demografía de Montevideo.

— Resultado pues, que requiere reformas po-

sitivas, como la de la vigilancia y protección de la niñez, estímulo á la lactancia materna como única y exclusiva y la creacion de institucion donde pudieran atenderse convenientemente los niños.

Esta cuestion de palpitante interes y comun á casi todos los pueblos de la América latina, que ha sido tratada por todos los higienistas que se han ocupado de ella, exige un desenvolvimiento mucho mayor que el que pudiéramos darle en estos cortos renglones, limitandones solamente, y por lo tanto, á señalarle, como lo hemos hecho antes de ahora, y llamar la atencion del pueblo y de las autoridades, sin cuyo concurso mútuó y reciproco, no es posible resolver, ni plantear, tan difícil problema.

ESTADO

El estado da, entre un total de 3057 fallecidos: 1296 menores de 15 años, (72 mas que en el año anterior) 698 solteros; 722 casados; 311 viudos y 30 cuyo estado era ignorado.

Las proporciones comparativas, del anterior y el actual, han sido las siguientes:

Menores de 15 años .	41.62 %	43 04
Casados y viudos	31.02 »	33 79
Solteros	22 05 »	22.83
Se ignora	5.09 »	0.98

Han fallecido pues, en el año corriente, mayor número de niños, casados, viudos y solteros que en el año anterior y menor cantidad de estado desconocido.

NACIONALIDADES

La cantidad de 2006 nacionales y la de 1033 extranjeros, da las proporciones siguientes : 9.28 por mil de nacionales, sobre la población total de la ciudad, y 4.77 de extranjeros tambien por mil, sobre la misma.

En el año anterior las proporciones fueron de 8.66 para los primeros y 4.80 para los últimos.

Montevideo, Diciembre de 1896.

JOAQUIN DE SALTERAIN.

**Mórtalidad de la ciudad de Montevideo,
desde Diciembre de 1895, hasta Noviembre de 1896**

GENERALES EPIDEMICAS, ETC.

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Tuberculosis generalizada . . .	1	1	1	1	2	1	2	3	3	4	2	2	23
Tuberculosis miliar aguda . . .	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
Tuberculosis pulmonar . . .	35	26	38	36	38	32	47	31	39	35	34	38	429
Tuberculosis intestinal . . .	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7
Tuberculosis meningea . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Meningitis tuberculosa . . .	8	6	3	5	6	5	4	4	9	7	5	4	66
Peritonitis tuberculosa . . .	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	7
Tuberculosis crónica . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Tuberculosis pulmonar y laringea	—	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	2	8
Tuberculosis peritoneal . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5
Pneumonia tuberculosa . . .	—	1	—	—	2	—	1	1	—	3	1	—	9
Osteitis tuberculosa . . .	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	6
Tuberculosis laringea . . .	—	—	—	2	1	1	—	1	2	1	2	—	10
Tuberculosis de las vías urinarias	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Euteritis tuberculosa . . .	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Tuberculosis mesentérica . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Cáncer del estómago . . .	3	3	2	5	—	5	2	2	4	2	2	4	34
Cáncer del seno . . .	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	5
Carcinoma del útero . . .	3	—	2	1	1	1	1	3	4	3	—	4	23
Carcinoma del esófago . . .	1	2	—	2	1	2	1	1	1	2	1	2	16
Epitelioma de la laringe . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cáncer de la vejiga . . .	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3
Neoplasma del higado . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Epitelioma del ovario . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sarcoma del cuello . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Estrechamiento del esófago . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Cáncer de la cabeza . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Carcinoma del abdomen . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Cáncer de la laringe . . .	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	5
Cáncer del cardias . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cáncer del higado . . .	—	3	—	1	—	2	2	1	—	2	—	1	12
Cáncer gastro hepático . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Cáncer . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
Cáncer del cuello . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Cáncer intestinal . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Fibro mioma uterino . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Epitelioma del corazon . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Epitelioma lingual . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5
Epitelioma del estómago . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Epitelioma del esófago . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cáncer de la lengua . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tumor cerebral . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Sarcoma del recto . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Sarcoma del útero . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Neoplasma uterino . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Epitelioma de la vejiga . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cáncer gastro-intestinal . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Caquexia carcinomatosa . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Cáncer de la boca . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1
Epitelioma . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Cáncer de las vías biliares . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
Cáncer de la vagina . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Cáncer de la mano . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Carcinoma peri-uterino . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Osteo sarcoma del maxilar inferior . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Neoplasma del estómago . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Neoplasma de la pleura . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Epitelioma nasal . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Cáncer glandular . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Epitelioma de la amigdalita . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Epitelioma de la cara . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Epitelioma de la laringe . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Cáncer del riñon . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Sarcoma inguinal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Sarampion . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Fiebre tifoidea . . .	11	6	4	1	3	2	4	3	1	1	3	1	31

[illegible]

SISTEMA NERVIOSO

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Anemia cerebral													2
Congestion cerebral	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	35
Conmocion cerebral	4	2	—	—	—	—	4	—	—	4	3	—	3
Apoplegia cerebral	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	6
Trombosis cerebral	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Embolia cerebral	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Hemorragia cerebral	12	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13
Reblandecimiento cerebral	4	11	5	—	—	—	—	3	3	—	4	—	76
Hemorragia bulbar	4	4	—	4	—	9	7	8	6	3	—	—	10
Hemorragia meningeal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Meningitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Meningitis aguda	—	22	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
Meningo-encefalitis	3	3	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	20
Meningitis cerebro-espinal	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Meningo-mielitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Encefalitis	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Absceso cerebral	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Tumor cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hidrocefalia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Peri-encefalitis difusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Mielitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Mielitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Mielitis transversa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Coma epiléptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Corea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Paralisis bulbar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Paralisis espinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Paralisis general	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Esclerosis en placas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Tabes dorsualis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Bocio exoftálmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	33	43	25	27	32	38	31	32	20	36	47	47	414

APARATO RESPIRATORIO

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Tos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Asma	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Epistaxis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Larvas de moscas en las fosas nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Angina crupal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Edema de la glotis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Laringitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Laringo bronquitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Adenopatía traqueo bronquial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Absceso del mediastino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Congestion pulmonar	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Apoplegia pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Hemorragia pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gangrena pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bronquitis	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Bronquitis aguda	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Bronquitis crónica	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Bronquitis capilar	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Bronco pneumonia	20	17	14	10	11	17	16	24	21	10	16	20	43
Bronco-pneumonia doble	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196
Pneumonia	5	3	4	5	5	6	3	—	—	—	—	—	22
Pneumonia doble	3	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	69
Pleuro-pneumonia	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
	4	4	4	4	—	3	2	—	—	—	—	—	40

Pleuresia	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Pleuresia purulenta	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Pleuresia traumática.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Quistes hidáticos de la pleura.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Crup.	2	1	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	39	35	25	23	54	43	52	36	29	36	42	459		

APARATO CIRCULATORIO	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Síncope cardíaco.	—	2	2	3	3	4	—	1	2	2	—	—	27
Cardiopatía	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Hepertrofia cardíaca.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Cianosis	1	—	1	1	1	—	—	2	—	—	2	—	9
Angina pectoris	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	2	—	15
Asistolia	—	—	1	—	1	2	2	3	—	—	—	—	11
Hidropesia.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Afección orgánica del corazón.	4	6	2	7	4	4	6	4	3	7	6	2	55
Endocarditis aguda	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Endocarditis reumática.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Endocarditis	—	—	1	1	3	2	1	—	1	1	2	—	12
Estrechez de la arteria pulmonar.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Estrechez é insuficiencia aórtico-mitral	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Insuficiencia valvular	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
Insuficiencia mitral	6	4	5	1	5	4	7	9	7	2	5	3	58
Insuficiencia aórtica.	5	1	1	1	—	4	4	—	3	1	2	—	24
Ateroma aórtico	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aneurisma de la aorta	2	1	1	1	1	2	1	—	—	3	—	—	16
Aortitis crónica	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aneurisma.	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	4
Peri-carditis	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
Endocarditis infecciosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Miocarditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Arterio esclerosis.	4	1	1	1	1	1	—	2	—	—	2	—	14
	24	21	19	19	20	25	28	22	20	20	20	29	271

APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Dispepsia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Fistula del esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gastritis	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Gastritis tóxica	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Gastro enteritis	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	5
Gastro enteritis infantil	21	9	20	14	10	3	2	5	1	6	5	14	110
Catarro gástrico	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Catarro gastro intestinal	—	—	6	2	1	1	—	—	1	—	2	1	14
Úlcera del estómago	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	6
Cólera infantil	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4
Disenteria crónica	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Enteritis	5	1	—	3	—	—	2	—	—	1	2	2	16
Enteritis aguda	3	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	11
Entero colitis	—	1	—	—	3	2	2	2	1	—	1	—	12
Colitis aguda infecciosa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Entero-rragia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Apendicitis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3
Oclusion intestinal	—	—	—	2	—	1	2	1	2	—	—	3	11
Obstruccion intestinal	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5
Tiflitis	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Hernia estrangulada	—	—	—	1	2	—	1	2	1	2	1	3	13
Litiasis biliar	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	5
Hepatitis	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	7
Ictericia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cirrosis hepática	1	—	1	3	1	—	2	1	2	1	—	2	14
Cirrosis atrofica	1	1	—	4	3	1	4	2	—	1	2	1	20
Cirrosis hipertrofica	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3
Quiste hidático	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3
Esplenomegalia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Peritonitis	1	—	1	2	1	4	2	—	4	3	5	4	27
Peritonitis aguda	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Peritonitis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Absceso hepático	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
	42	20	32	41	25	19	22	17	18	16	23	39	314

GENITO URINARIO

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Nefritis	2	—	1	1	1	1	1	—	3	2	4	1	17
Nefritis aguda	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	5
Nefritis crónica	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
Nefritis parenquimatosa	—	2	3	3	—	1	1	3	1	—	3	3	20
Nefritis intersticial	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	2	1	11
Mal de Bright	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	1	—	8
Nefritis calculosa	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Nefritis mixta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
Albuminuria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Uremia	4	4	3	2	3	3	5	2	3	3	1	6	9
Nefritis sistemática arterial	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cistitis crónica	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4
Infiltracion de orina	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Fistula vesical	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Hipertrofia prostática	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Parálisis vesical	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Litiasis vesical	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hematocele	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hemorragia uterina	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Celulitis pélvia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Metro peritonitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
	9	9	11	12	7	9	11	9	11	12	15	12	127

[illegible]

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Hemorragia puerperal	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Peritonitis puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	4
Eclampsia puerperal	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3
Uremia puerperal	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fiebre puerperal	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4
	—	1	2	—	—	3	2	4	—	2	1	—	15

VEJEZ	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Senectud	—	—	—	2	1	3	2	1	1	—	1	—	13
Marasmo senil	—	1	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	11
Caquexia senil	—	—	2	1	—	2	1	—	1	1	3	—	7
Debilidad senil	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	7
Pneumonie senil	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	1
	2	1	2	3	4	9	5	5	2	1	5		39

ENVENENAMIENTO,
MUERTES VIOLENTAS, IGNORADAS, ETC.

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Herida por arma de fuego	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Herida por arma blanca	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Herida penetrante del torax	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Herida pulmonar por hundimiento	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Herida de bala en el cráneo	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4
Herida dislacerante	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Herida penetrante del abdomen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Herida penetrante	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3
Traumatismo accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fractura de la columna vertebral	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Fractura del cráneo	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fractura de la base del cráneo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Fractura del fémur	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
Fractura complicada	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Comocion cerebral por caída	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Contusion torácica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Shock traumático	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hemorragia interna	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5
Quemaduras	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Quemaduras de 2.º grado	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Quemaduras de 3er. grado	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Asfixia por sumersion	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Intoxicacion gastro-intestinal	1	2	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	13
Introxicaion por el sublimado	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Envenenamiento por fosforo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Envenenamiento por el ácido fé- nico	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Envenenamiento por fósforo (sui- cidio)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Se ignora	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	5
	8	8	12	10	3	5	4	4	5	3	10	8	80

NACIDOS MUERTOS
1895-1896

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Nacidos muertos.	44	23	17	48	46	49	49	49	45	46	22	48	215

RESUMEN GENERAL

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Enfermedades generales etc	122	113	99	114	101	114	121	113	146	101	109	146	1339
Enfermedades del sistema ner- vioso.	33	43	25	27	32	38	34	32	20	36	47	47	411
Enfermedades del aparato respi- ratorio	45	39	35	25	23	54	43	52	36	29	36	42	459
Enfermedades del aparato circu- latorio	24	24	49	49	20	25	28	22	20	20	29	24	271
Enfermedades del aparato diges- tivo y anexos	42	20	32	44	25	49	22	47	18	46	23	39	314
Enfermedades del aparato genito- urinario.	9	9	44	42	7	9	41	8	14	43	45	42	127
Enfermedades del aparato loco- motor	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Enfermedades puerperales.	—	4	2	—	—	3	2	4	—	2	—	4	15
Enfermedades de la vejez	2	4	2	3	4	9	5	5	2	4	5	—	39
Envenenamientos ignoradas, etc.	8	8	42	40	3	5	4	4	5	3	40	8	80
	285	256	238	251	215	276	267	257	228	221	274	289	3067

Mortalidad de la ciudad de Montevideo segun las edades, desde el mes de Diciembre de 1895 hasta Noviembre de 1896 (inclusive)

[illegible]

Total

F

Mortalidad de la ciudad de Montevideo, segun la nacionalidad de los fallecidos, desde el mes de Diciembre de 1895 hasta Noviembre de 1896 (inclusive)

	Orientales	Italianos	Espanoles	Argentinos	Franceses	Brasileños	Inglese	Suecos	Portugueses	Austríacos	Paraguayos	Alemanes	Chilenos	Suizos	Griegos	Africanos	Belgas	Norte Americanos	Primos	Dinamarqueses	Se ignora	Nacionales	Extranjeros	TOTAL
Diciembre.	206	31	30	4	8	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	206	79	285
Enero.	171	37	31	4	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	171	85	256
Febrero.	158	28	28	11	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	158	78	238
Marzo.	155	42	28	9	11	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	155	95	251
Abril.	136	26	27	4	9	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	136	78	215
Mayo.	176	34	38	4	11	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	176	96	276
Junio.	162	37	36	9	9	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	162	102	267
Julio.	163	39	34	5	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	163	92	257
Agosto.	151	28	27	5	8	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	151	75	228
Setiembre.	150	28	23	3	10	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	150	71	221
Octubre.	180	38	23	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	180	93	274
Noviembre.	198	44	28	7	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	198	90	289
TOTALES.	2006	412	358	75	99	22	11	1	8	5	3	9	2	15	3	5	1	1	2	1	18	2006	1033	3057

Mortalidad en la ciudad de Montevideo, segun el estado de los fallecidos, desde Diciembre de 1895 hasta Noviembre de 1896 inclusive

ESTADO 1895-1896	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Menores de 15 años.	156	117	115	99	86	112	94	110	94	85	105	123	1296
Solteros.	56	53	50	68	43	56	65	56	58	54	74	65	698
Casados.	42	58	51	60	64	65	79	67	49	60	57	70	722
Viudos.	25	27	20	24	20	39	26	22	23	22	34	29	311
Se ignora.	6	1	2	1	2	4	3	2	4	1	4	2	30
	285	256	238	251	215	276	267	257	228	221	274	289	3057

DENUNCIAS
DE AFECCIONES INFECTO-CONTAGIOSAS, CUYA
DECLARACION ES OBLIGATORIA

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Total de denuncias	Mortalidad
Sarampion.	254	144	58	54	42	107	81	76	50	27	45	36	971	41
Diftéria.	43	43	5	13	26	13	23	16	15	15	14	10	176	38
Fiebre tifoidea.	40	43	17	37	35	38	16	8	6	8	6	7	204	41
Escarlatina.	40	4	4	2	17	9	18	12	11	6	6	15	108	6
Viruela.	6	6	14	14	4	6	18	16	19	1	3	3	15	13
Varioloides.	3	—	—	—	—	—	2	3	1	2	—	—	8	15
Fiebre puerperal.	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	296	175	95	120	126	173	158	133	102	77	88	77	1620	154

FALLECIDOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Hospital de Caridad.	35	40	26	24	24	27	39	27	21	26	31	25	345
Casa de Aislamiento.	14	5	10	15	12	11	7	3	8	11	12	11	118
Asilo de Expositos.	12	14	10	6	11	12	14	15	5	6	14	10	129
Manicomio Nacional.	9	7	5	14	6	3	9	13	6	12	21	11	116
Hospital Italiano.	2	4	6	5	2	8	2	—	3	3	2	5	42
Asilo del Buen Pastor.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Cárcel Penitenciaria.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4
Hospital Inglés.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	72	70	60	63	56	61	71	58	43	58	82	63	757